

Distr. Sibiria, Manshuria, Mongolia & China bor.

37. **Ceratophyllum demersum** Linnaeus, Sp. Pl. 992 (1753).

f. **quadrispinum** (Makino) Kitagawa, stat. nov.—*C. demersum* Linnaeus var. *quadrispinum* Makino in Journ. Jap. Bot. **1**: 21 (1917)—*C. pentacanthum* Hayata, Icon. Pl. Form. **8**: 130 t. 57 a (1918), non Haynald (1881)—*C. oryzetorum* Komarov in Bull. Jard. Bot. Princ. URSS **30**: 200 (1932)—*C. demersum* Linnaeus var. *pentacorne* Kitagawa in Rep. First Sci. Exped. Manch. sect. 4: **4**: 16, 80 (1936): Lineam. Fl. Mansh. 207 (1939).

Nom. Jap. Gohari-kingyomo, Gohari-matumo, Yotubari-kingyomo.

Distr. Ussuri, Manshuria, China, Formosa & Japonia.

38. **Aconitum jaluense** Komarov in Act. Hort. Petrop. **18**: 439 (1901).

f. **glabrescens** (Nakai) Kitagawa, stat. nov.—*A. jaluense* Komarov var. *glabrescens* Nakai in Bot. Mag. Tokyo **43**: 440 (1929)—*A. manshuricum* Nakai, l.c. (in nota) (1929)—*A. triphyllum* Nakai var. *manshuricum* Nakai in Rep. First Sci. Exped. Manch. sect. 4: **2**: 158 (1935), syn. nov.

Nom. Jap. Mansyû-torikabuto, Mansyû-mituba-torikabuto.

Distr. Korea & Manshuria.

39. **Draba nemorosa** Linnaeus, Sp. Pl. 643 (1753).

f. **leiocarpa** (Lindberg) Kitagawa, stat. nov.—*Dr. nemorosa* Linnaeus var. *leiocarpa* Lindberg in Linnæa **13**: 333 (1839).

Nom. Jap. Me-inunazuna.

Distr. Europa, Caucasus, Asia media, Sibiria, China, Manshuria, Korea, Japonia & America Bor.

**○コヒルガオの白花品** (檜山庫三) Kozo HIYAMA: A white-flowered form of *Calystegia hederacea*

コヒルガオで稀に白花のものがあって、1964年5月9日に神奈川県川崎市の大師公園で桜井廉氏が採集されたので、これをシロバナコヒルガオと新称する。花冠は純白色でじつに清潔な感じのものである。なお、このコヒルガオはヒルガオより花期がずっと早く、東京では4月20日に開花したものを見ている。 (都立大学牧野標本館)

**Calystegia hederacea** Wall. forma **Sakuraii** Hiyama, nov. f.

Corolla candida. Cetera ut in typo.

Nom. Jap. Shirobana-kohirugao (nov.).

Hab. Daishi-machi, Kawasaki, Prov. Musashi (R. Sakurai, May 9, 1964—holotype in Makino Herbarium).